

Ключевые моменты содержания и кормления несушек в продуктивный период (период яйцекладки) — 20-78 недель

1. Нормативный вес для начала периода яйценоскости для НЕСУШЕК кросса Доминант не менее 1,4-1,5 кг живой массы. Птица, не достигшая этой живой массы, независимо от возраста, нестись не будет.
2. Плотность посадки при напольном содержании 5-7 голов на 1 кв.м.
3. Фронт кормления: 12 см на голову.
4. Фронт поения: 3 см голову, обеспечить постоянный доступ к свежей и чистой воде
5. Рекомендуемый рацион кормления: **Комбикорм для несушек ПК-1-2 ООО «Агрокормсервис плюс».** При самостоятельном приготовления корма, обратите внимание на стабильность рациона (должен быть сбалансированным, с достаточным уровнем клетчатки и постоянством ингредиентов). Резкое изменение рациона или ингредиентов рациона, может привести, в том числе, к случаям расклёва и каннибализма. Уровень протеина и энергии регулируется суточной нормой скармливания корма. Особое внимание при самостоятельном составлении кормового рациона необходимо уделить содержанию натрий хлора (соль). При использовании готового гранулирования корма возможно добавление цельной пшеницы до 10% для развития желудка и повышения общего иммунитета птицы.
70-80% раздачи общего объёма корма в день должны осуществляться в вечернее время.
6. **Интенсивность освещения и температуры:** С 20 недели жизни интенсивность освещения, особенно в зоне гнёзд не должна превышать 10 люкс или 2-4 ватта на 1 кв.м. В периоды с коротким световым днём (поздняя осень — зима - ранняя весна) обеспечить птице 14-15 часововой световой режим в течение суток. В период, когда температура окружающей среды понижается и обогрев птицы без дополнительных источников тепла становится затруднён, поддерживать необходимую минимальную температуру в птичнике не ниже 18 градусов Цельсия поможет использование инфра.красных ламп мощностью **150-175 ватт.**
Чем ниже температура помещения от стандартного норматива (18 градусов Цельсия), тем выше потребление птицей кормов из расчёта на собственный обогрев и продуктивность.
7. **Подстилка и микроклимат:** обязательно обращать внимание на качество подстилочного материала., сухая и свежая. Для предотвращения скапливания влаги и соблюдения оптимального гигиенического состояния подстилки, особенно в периоды дождливой и сырой погоды (осень-весна), рекомендуется использовать препарат **«Санвит-К подстилка».** Обеспечить достаточную вентиляцию в помещении, но без сквозняка. Оптимальный уровень воздухообмена 1-6 кубических метров свежего воздуха в час на 1 кг живого веса несушек в зависимости от температуры и влажности. Оптимальная влажность в птичнике - 40 – 60 %.
8. **Количество гнёзд:** 4 несушки на 1 гнездо.
9. При напольном содержании необходимо иметь зоны личной гигиены (песок, зола, опилки и т. д.), где птица могла бы принимать ванны.
10. Если наблюдается возникновение расклёва (каннибализма) в первую очередь необходимо выявить и изолировать из стада травмированную / агрессивную птицу. При выгульном содержании должны быть организованы теневые зоны; так же можно использовать отвлекающие мероприятия (разброс цельного зерна по подстилке, туки соломы, картонные изделия к примеру коробки или старые ячейки). **Норматив:** 20 - 47 недель (115-120 гр/голову)
11. **Примерная схема приготовления рациона для НЕСУШЕК в период яйцекладки.**

Сырье	%	Кол - во на 10 кг
Пшеница 10.66%	55.0	5.500
Жмых подсолн 34/18 сеть	18.0	1.800
Кукуруза 7,5%	10.9	1.090
Ракушка / Мел	9.4	0.940
БВМК Хендрикс 5% Лейкон	4.5	0.450
Дефт/фосфат	1.1	0.110
Соевое масло	0.9	0.090
Соль поваренная	0.2	0.020